MBL/WHOI
0 0301 0014117 2

LES

CHAMPIGNONS

(FUNGI, HYMENOMYCETES)

QUI CROISSENT EN FRANCE

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

PROPRIETES UTILES OU VENENEUSES

PAR

C. C. GILLET

VETERINAIRE PRINCIPAL EN RETRAITE
MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIETE LINNEENNE DE NORMANDIE

ATLAS

PARIS

LIBRAIRIE J. B. BAILLIERE ET FILS
19, rue Hautefeuille, pres du boulevard Saint-Germain
L'auteur, rue de l'Adoration, 23, a Alencon (Orne)

1878

Tous droits reserves

10175

ORDRE GENERAL DE CLASSEMENT

AGARICINEES.

301. 1. Mycena hiemalis.
2. " corticola.
302. " inclinata.
303. " janthina.
304. " lactea.
305. " lepoteephala.
306. " lineata.
307. " oetites.
308. " peltata.
309. " plicato-crenata.
310. " plicosa.
315. " prolifera.
316. " pura, V. Alba.
317. " pura, Var. lutea.
318. " roeborhizus.
319. " sudora.
320. " vitrea.
321. " zephyrus.
322. Naucoria anguineus.
323. " badipes.
324. " carpophila.
325. " erinacea.
326. " pediades.
327. " semiorbicularis.
328. " temulenta.
329. Nolanea mammosa.
330. " nigripes.
331. " pascua.
332. " pisciodorus.
333. " rufocarnea.
334. Nyctalis asterophora.
335. Omphalia dumosa.
336. " gracillima.
337. " rustica.
338. " swartzii.
339. Panoeolus campanulatus.
340. " fumicola.
341. " separatus.
342. " sphinctrinus.
342. Panus torulosus.
344. Paxillus atrotomentosus.
345. " griseo-tomentosus.
346. " involutus.
347. " lepista.
348. Pholiota aurivella.
349. " blattaria.
350. " caperata.
351. " comosa.
352 " destruens.
353. " aegerita.
354. Pholiota mutabilis.
355. " praecox.
356. " radicellata.
357. " togularis.
358. " unicolor.
359. Pleurotus eryngii.
360. " lignatilis.
361. " nebrodensis.
362. " olearius.
363. " ostreatus.
364. " petaloides.
365. " pometi.
366. " sapidus.
367. " septicus, Var. chioneus.
368. Pluteolus reticulatus.
369. Pluteus cervinus.
370. " cervinus, Var. patricius.
371. 1. Pluteus hispidulus.
2. Pluteus pellitus.
372. " leoninus.
373. Pratella arvensis.
374. " augusta.
375. " campestris.
376. " campestris, Var. praticola.
377. " echinata.
378. " flavescens.
379. " hemorrhoidaria.
380. Pratella sylvatica; psalliota sylvatica.
381. " xanthoderma.
382. Psathyra conopileus.
383. " corrugis.
384. " gossypinus.
385. Psathyrella caudata.
387. " disseminata.
387. " hydrophora.
388. " pronus.
389. " subatrata.
390. Psilocybe areolatus.
391. " fenisecii.
392. Russula alutacea.
393. " azurea.
394. " chameleontina.
395. " chlora.
396. " citrina.
397. " cerulea, v. Umbonata.
398. " consobrina, Var. Sororia.
399. " cyanoxantha.
400. " cypriani.

AGARICINÉES

1. MYCENA HIEMALIS. Fr. 2. M. CORTICOLA. Schum.

MYCENA INCLINATA. fr.

MYCENA JANTHINA, Secr.

MYCENA LACTEA. Pers.

MYCENA LEPTOCEPHALA. Fr.

MYCENA LINEATA. Bull.

MYCENA ŒTITES. Fr.

MYCENA PELTATA. Fr.

MYCENA PLICATO-CRENATA. Fr.

MYCENA PLICOSA. Fr.

MYCENA PROLIFERA. Fr.

MYCENA PURA. Pers. V. Alba.

MYCENA PURA. VAR. LUTEA. Secr.

MYCENA RŒBORHIZUS *Fr.*

MYCENA SUDORA, fr.



MYCENA VITREA. Fr.

MYCENA ZEPHYRUS. Fr.

NAUCORIA ANGUINEUS. Fr.

NAUCORIA ANGUINEUS. Fr.

NAUCORIA BADIPES Fr

NAUCORIA CARPOPHILA. Fr.

NAUCORIA ERINACEA. Fr.

NAUCORIA PEDIADES. Fr

NAUCORIA SEMIORBICULARIS. Bull.

NAUCORIA TEMULENTA, *Fr.*

NOLANEA MAMMOSA. L.

NOLANEA NIGRIPES, Trig.

NOLANEA PASCUA. Pers.

NOLANEA PISCIODORUS. Ces.

NOLANEA RUFOCARNEA. Bœrkl.

NYCTALIS ASTEROPHORA. Fr.

OMPHALIA DUMOSA. Fr.

OMPHALIA GRACILLIMA. Weinm.

OMPHALIA RUSTICA Fr.

OMPHALIA SWARTZII. Fr.

PANŒOLUS CAMPANULATUS, L.

PANŒOLUS FUMICOLA, *Fr.*



PANŒOLUS SEPARATUS. Fr.

PANŒOLUS SPHINCTRINUS. Fr.

PANUS TORULOSUS. fr.

PAXILLUS ATROTOMENTOSUS Fr.

PAXILLUS GRISEO-TOMENTOSUS. Fr.

PAXILLUS INVOLUTUS. Fr.



PAXILLUS LEPISTA. Fr.

PHOLIOTA AURIVELLA. Fr.

PHOLIOTA BLATTARIA, Fr.

PHOLIOTA CAPERATA Fr.

PHOLIOTA COMOSA, Fr.

PHOLIOTA DESTRUENS. Fr

PHOLIOTA ÆGERITA, fr.

PHOLIOTA MUTABILIS. Schœff.

PHOLIOTA PRŒCOX. Pers.

PHOLIOTA RADICELLATA GIL.

PHOLIOTA TOGULARIS. Bull.

PHOLIOTA UNICOLOR. Fl. dan.

PLEUROTUS ERYNGII D.C.

PLEUROTUS LIGNATILIS, Fr.

PLEUROTUS NEBRODENSIS. Inseng

PLEUROTUS OLEARIUS. Dc.

PLEUROTUS OSTREATUS. Fr.

PLEUROTUS PETALOIDES, Bull.



PLEUROTUS POMETI . Fr.

PLEUROTUS SAPIDUS. KALEK.

PLEUROTUS SEPTICUS, *Fr.*
Var. CHIONEUS, *Pers.*

PLUTEOLUS RETICULATUS Fr.

PLUTEUS CERVINUS. Schœff.

PLUTEUS CERVINUS. Fr. Var. PATRICIUS. Schlz.

1 PLUTEUS HISPIDULUS. fr. Pl. PELLITUS. Pers

PLUTEUS LEONINUS Schœff.



PRATELLA ARVENSIS. Fr.

PRATELLA AUGUSTA, Fr.

PRATELLA CAMPESTRIS . L.

PRATELLA CAMPESTRIS. *Var. Praticola.* Vitt.

PRATELLA ECHINATA Fr

PRATELLA FLAVESCENS. GILLET.



PRATELLA HŒMORRHOIDARIA. FR.

PRATELLA SYLVATICA

PSALLIOTA SYLVATICA Schœf

PRATELLA XANTHODERMA. Genevier.

AGARICUS SILVICOLA. Fr.

PSATHYRA CONOPILEUS. Fr.



PSATHYRA CORRUGIS, fr.

PSATHYRA GOSSYPINUS. Bull.

PSATHYRELLA CAUDATA, Fr.

PSATHYRELLA DISSEMINATA. Pers.

PSATHYRELLA HYDROPHORA. fr.

PSATHYRELLA PRONUS. Fr.

PSATHYRELLA SUBATRATA. Batsch.

PSILOCYBE AREOLATUS. Klotz.

Chapeau peu charnu, presque membraneux, convexe, ochracé plus ou moins foncé, diam. 1-3 cent. ; d'abord lisse, fibrilleux, il ne tarde pas à se couvrir, par suite de la rupture de l'épiderme qui le recouvre, d'aréoles carrées, de grandeur irrégulière — feuillets presque libres, légèrement adhérents, brunâtres puis noirâtres ; — pied grêle (1-2 mm. d'epaisseur), fistuleux, fibrilleux, épaissi à la base plus ou moins cotonneuse, sa longueur est de 7-8 centimètres — *sur la terre.*

PSILOCYBE AREOLATUS. Klotz

PSILOCYBE FŒNISECII. Fr.

RUSSULA ALUTACEA Pr.



RUSSULA AZUREA. Bres.



RUSSULA CHAMŒLEONTINA, fr.

RUSSULA CHLORA. Gillet.

RUSSULA CITRINA. Gillet.

RUSSULA CŒRULEA. Pers. v. Umbonata.

RUSSULA CONSOBRINA. Fr. Var. Sororia.

RUSSULA CYANOXANTHA, Schœff

RUSSULA CYPRIANI. Gilt.